

τῆς δραστικότητος αὐτῶν. Τέλος ἐπλησίασαν πρὸς κοινὰς θέρμας καὶ οὕτως ἐξηγητέα ἴσως ἡ μεγάλη ὁμοιότης τῆς σιφραῖς σμύριδος μετὰ μετασωματογενῶν σιδηρομεταλλευμάτων.

Σ. Α. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΗ

εἰς τὴν θεωρίαν τῶν γραμμικῶν ἐξισώσεων μετασχηματισμοῦ ἐν τῇ Ἠλεκτροδυναμικῇ κατὰ τὴν νέαν ἀρχὴν τῶν σχετικῶν κινήσεων.

Ἐν τοῖς ἐπομένοις ἀποδεικνύω πλὴν ἄλλων, ὅτι αἱ ἐξισώσεις γραμμικοῦ μετασχηματισμοῦ ἐν τῇ Ἠλεκτροδυναμικῇ κατὰ τὴν νέαν ἀρχὴν τῶν σχετικῶν κινήσεων (πβλ. σχετικὴν διατριβὴν μου ἐν τῷ «Ἀρχιμήδει» Φεβρουαρίου 1910) δύνανται νὰ εὐρεθῶσι καὶ ἐκ τῶν ἐξισώσεων τῶν δονήσεων ἐλαστικοῦ μέσου.

Αἱ γενικαὶ ἐξισώσεις τῆς κινήσεως τῶν μορίων παντὸς ἐλαστικοῦ σώματος ἄνευ τινὸς ἐξωτερικῆς δυνάμεως εἰσιν αἱ ἐπόμεναι (πβλ. H. Poincaré, Leçons sur la théorie de l'élasticité, 1892):

$$1) \begin{cases} (\lambda + \mu) \frac{\partial \theta}{\partial x} + \mu \Delta \xi = \rho \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \\ (\lambda + \mu) \frac{\partial \theta}{\partial y} + \mu \Delta \eta = \rho \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} \\ (\lambda + \mu) \frac{\partial \theta}{\partial z} + \mu \Delta \zeta = \rho \frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} \end{cases}$$

ὅπου λ καὶ μ σταθεραὶ ποσότητες, ρ ἡ πυκνότης καὶ

$$\theta = \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \zeta}{\partial z}$$

$$\Delta \xi = \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \zeta}{\partial z^2}, \dots$$

Αἱ ἐξισώσεις 1) καθορίζουσι τὰ ξ, η, ζ, ἅτινα διὰ t=0 εἶναι δεδομένα συναρτήσεις τῶν x, y, z ἐν τῷ ἐσωτερικῷ τοῦ σώματος, ὡς καὶ αἱ παράγωγοι αὐτῶν πρὸς τὸν χρόνον t.

Ἡ κίνησις λέγεται, ὅτι γίνεται δι' ἐπιπέδων κυμάτων παραλλήλων πρὸς τὸ ἐπίπεδον τῶν xy, ὁπότεν τὰ ξ, η, ζ ἐξαρτῶνται μόνον ἐκ τοῦ z καὶ τοῦ t. Ἐν δὲ τῇ περιπτώσει ταύτῃ εἶναι

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial \theta}{\partial y} = 0$$

καὶ αἱ ποσότητες θ, Δξ, Δη, Δζ ἀνάγονται εἰς

$$\frac{\partial \zeta}{\partial z}, \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2}, \frac{\partial^2 \eta}{\partial z^2}, \frac{\partial^2 \zeta}{\partial z^2}.$$

Κατὰ δὲ ταῦτα αἱ ἐξισώσεις 1) καθίστανται:

$$2) \begin{cases} \mu \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = \rho \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \\ \mu \frac{\partial^2 \eta}{\partial z^2} = \rho \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} \\ (\lambda + 2\mu) \frac{\partial^2 \zeta}{\partial z^2} = \rho \frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} \end{cases}$$

ὧν τὰ γενικὰ ὀλοκληρώματα εἶναι τῆς μορφῆς:

$$3) \begin{cases} \xi = \sigma_1(z - \omega_1 t) + \varphi_1(z + \omega_1 t) \\ \eta = \sigma_2(z - \omega_2 t) + \varphi_2(z + \omega_2 t) \\ \zeta = \sigma_3(z - \omega_3 t) + \varphi_3(z + \omega_3 t) \end{cases}$$

ὅπου χάριν συντομίας ἐτέθη

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}$$

καὶ αἱ συναρτήσεις σ καὶ φ εἰσὶν οἰαδήποτε.

Τεθεῖσθω νῦν, ὅτι ὑπάρχει καὶ δυναμικὸν τῶν ταχυτήτων τ(x, y, z, t) καθοριζόμενον (πβλ. «Ἀρχιμήδης» Φεβρουαρίου 1910) ὑπὸ τῆς ἐξισώσεως:

$$4) \frac{\partial^2 \tau}{\partial t^2} = \frac{1}{\omega^2} \frac{\partial^2 \tau}{\partial z^2}$$

καὶ θεωρήσωμεν τὴν μερικὴν περίπτωσιν, καθ' ἣν

$$5) \begin{cases} \xi = x \\ \eta = y \\ \zeta = \kappa(z - \omega t) \\ \tau = \kappa(-\omega z + t) \end{cases}$$

ἦτοι τὴν περίπτωσιν, καθ' ἣν ἐν τῇ ὁμαλῇ μεταβατικῇ κινήσει μόνον τὸ ζ καὶ τὸ τ μεταβάλλονται συναρτήσεσι τοῦ z καὶ τοῦ t. Φανερόν, ὅτι ὁ γραμμικὸς μετασχηματισμὸς 5) εἶναι ὀρθογώνιος, ὅταν $\kappa^2 - \omega^2 = 1$, ἦτοι ὅταν

$$\kappa = \frac{1}{\sqrt{1 - \omega^2}}$$

ὅπου ἐν τῇ πραγματικότητι ἡ ὁμαλὴ ταχύτης ω τῆς διαδόσεως τοῦ κύματος ὀφείλει νὰ ᾖναι

σταθερά τις θετική ή αρνητική ποσότης τοιαύτη, ὥστε $|\omega| < 1$, ἤτοι ἐλάσσων τῆς τοῦ φωτός ταχύτητος. Ἡ ποσότης τ καλεῖται τοπικὸς χρόνος τοῦ κινουμένου συστήματος. Διὰ τὴν κίνησιν τῆς Γ ἔν ἰσχύει πρὸς τὸ σύστημα τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων εἶναι περίπου $\omega = 0,0001$.

Ἐκ δὲ τῶν τύπων

$$6) \begin{cases} \zeta = x(z - \omega t) \\ \tau = x(\leftarrow \omega z + t) \end{cases}$$

προκύπτει

$$7) \begin{cases} z = x(\zeta + \omega t) \\ t = x(\omega \zeta + t) \end{cases}$$

ὅθεν διὰ $\zeta = 0$ συνάγεται

$$8) \quad t = x\tau \quad \eta \quad \tau = t\sqrt{1 - \omega^2}$$

ὥστε ὁ τοπικὸς χρόνος τ ἐν τῷ κινουμένῳ συστήματι εἶναι διάφορος τοῦ χρόνου t τοῦ μόνιμου συστήματος.

Ὅποτε πρόκειται περὶ κυμάτων ἀντιστοιχούντων πρὸς περιοδικὰς δονήσεις, αἱ τιμαὶ τῶν ξ, η, ζ δίδονται ὑπὸ τὴν γενικὴν μορφήν (λαμβάνομένων ὑπ' ὄψιν μόνον τῶν πραγματικῶν μερῶν):

$$9) \begin{cases} \xi = Ae^{iP} \\ \eta = Be^{iP} \\ \zeta = Ge^{iP} \end{cases}$$

ὅπου $P = ax + by + cz + vt$ καὶ A, B, Γ συναρτήσεις τῶν x, y, z .

Καὶ ἡ μὲν συνθήκη τῆς ἐγκαρσίας διαδόσεως τῶν κυμάτων εἶναι

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \zeta}{\partial z} = 0$$

ἢ

$$10) \quad Aa + Bb + \Gamma\gamma = 0,$$

ἣτις σημαίνει, ὅτι ἡ διεύθυνσις τῆς δονήσεως εὐρίσκεται ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ κύματος καὶ εἶναι

$$\omega_1^2 \Delta \xi = \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

ἢ

$$- \omega_1^2 (a^2 + b^2 + \gamma^2) Ae^{iP} = -v^2 Ae^{iP}$$

ὅθεν

$$11) \quad v = \omega_1 \sqrt{a^2 + b^2 + \gamma^2},$$

ἢ δὲ συνθήκη τῆς προμήκους διαδόσεως τοῦ κύματος εἶναι, ὅτι

$$\xi dx + \eta dy + \zeta dz$$

ἔοικει νὰ ᾖναι τέλειον διαφορικόν, ἤτοι εὐρεῖται νὰ ᾖναι

$$12) \quad \frac{A}{a} = \frac{B}{b} = \frac{\Gamma}{\gamma}$$

ὅπερ σημαίνει, ὅτι ἡ διεύθυνσις τῆς δονήσεως εἶναι κάθετος πρὸς τὸ ἐπίπεδον τοῦ κύματος καὶ εἶναι

$$13) \quad v = \omega_2 \sqrt{a^2 + b^2 + \gamma^2}.$$

Τεθεῖσθω, ὅτι

$$A = A_1 + iA_2$$

$$B = B_1 + iB_2$$

$$\Gamma = \Gamma_1 + i\Gamma_2$$

καὶ ὅτι οἱ συντελεσταὶ a, b, γ εἶναι πραγματικοί· τότε εἶναι

$$e^{iP} = \text{συν } P + i \eta \mu P$$

καὶ (διατηρουμένων μόνον τῶν πραγματικῶν μερῶν)

$$14) \begin{cases} \xi = A_1 \text{συν } P - A_2 \eta \mu P \\ \eta = B_1 \text{συν } P - B_2 \eta \mu P \\ \zeta = \Gamma_1 \text{συν } P - \Gamma_2 \eta \mu P \end{cases}$$

Ἡ δὲ ἀπαλοιφή τοῦ P ἐκ τῶν ἐξισώσεων τούτων ἄγει εἰς τὰς ἐπομένους ἐξισώσεις τοῦ δευτέρου βαθμοῦ πρὸς ξ, η, ζ :

$$15) \begin{cases} (B_1 \xi - A_1 \eta)^2 + (B_2 \xi - A_2 \eta)^2 = (A_1 B_2 - A_2 B_1)^2 \\ (\Gamma_1 \eta - B_1 \zeta)^2 + (\Gamma_2 \eta - B_2 \zeta)^2 = (B_1 \Gamma_2 - B_2 \Gamma_1)^2 \\ (A_1 \zeta - \Gamma_1 \xi)^2 + (A_2 \zeta - \Gamma_2 \xi)^2 = (A_1 \Gamma_2 - A_2 \Gamma_1)^2 \end{cases}$$

Παρατηρητέον δέ, ὅτι δυνατὸν καὶ οἱ συντελεσταὶ a, b, γ νὰ ᾖναι μιγαδικοὶ ἀριθμοί, καὶ ἐπομένως εἶναι διὰ $P = P' + iP''$

$$16) \begin{cases} \xi = A_1 e^{-P'} \text{συν } P' - A_2 e^{-P'} \eta \mu P' \\ \eta = B_1 e^{-P'} \text{συν } P' - B_2 e^{-P'} \eta \mu P' \\ \zeta = \Gamma_1 e^{-P'} \text{συν } P' - \Gamma_2 e^{-P'} \eta \mu P' \end{cases}$$

Ἐκ δὲ τῶν ἐξισώσεων τούτων προκύπτουσιν αἱ ἐξισώσεις 15) ἔχουσαι τὰ δευτέρα αὐτῶν μέλη πολλαπλασιασμένα ἐπὶ $e^{-2P''}$.

Ὁ γραμμικὸς μετασχηματισμὸς δ) κέκτηται τὴν ιδιότητα τῶν συστημάτων τῶν συντελεστῶν (groupes).

Ἐκ τῶν ἐξισώσεων 6) καὶ 7) προκύπτει

$$\frac{\zeta}{\tau} = \frac{\kappa z - \kappa \omega t}{-\kappa \omega z + \kappa t}, \quad \frac{z}{t} = \frac{\kappa \zeta + \kappa \omega t}{\kappa \omega \zeta + \kappa t}$$

ἢ

$$17) \quad Z = \frac{\kappa z_1 - \kappa'}{\kappa' z_1 + \kappa}, \quad z_1 = \frac{\kappa Z + \kappa'}{\kappa' Z + \kappa}$$

ὅπου ἀντὶ $\frac{\zeta}{\tau}$, $\frac{z}{t}$, $\kappa \omega$, ἐτέθη χάριν συντομίας Z , z_1 , κ' . Ἡ δὲ σύστασις τῶν τύπων 17) εἶναι προφανῶς ὁμοία. Οἱ συντελεσταὶ τῶν τύπων τούτων εἶναι πραγματικοὶ ἀποτελοῦντες συστήματα συνεχῆ ἢ ἀσυνεχῆ (groupes continus ou discontinus).

Τὰ ὁλοκληρώματα ἄρα

$$\zeta = \kappa(z - \omega t) \\ \tau = \kappa(-\omega z + t)$$

τῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων εἰς μερικὰς παραγώγους:

$$\frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} = \omega^2 \frac{\partial^2 \zeta}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 \tau}{\partial t^2} = \frac{1}{\omega^2} \frac{\partial^2 \tau}{\partial z^2}$$

κέκτηνται τὸν χαρακτήρα τῶν συστημάτων τῶν συντελεστῶν (groupes), ὡς καὶ τὰ ὁλοκληρώματα ὠρισμένου εἴδους γραμμικῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων (fonctions fuchsienues κατὰ Poincaré).

ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΟΛΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΘΕΙΩΝ ΔΟΚΩΝ

1.—Ἡ γενικὴ θεωρία τῆς κάμψεως τῶν δοκῶν ἐπιτρέπει ἐν ἀνάγκῃ τὴν ἐπίλυσιν ἀπάντων τῶν ζητημάτων, ἅτινα ἀφορῶσι τὴν ἰσορροπία καὶ κάμψιν εὐθείας δοκοῦ στηριζομένης ἐπὶ πολλῶν ὑποστηρίγματων.

Θεωρήσωμεν τῶ ὄντι εὐθεῖαν δοκὸν τεθειμένην ἐπὶ $n+1$ ὑποστηρίγματων αἰσθητῶς ἰσοῦσῶν, ἤτοι συγκειμένων ἐκ n διαστύλων, ἕφ' ἐκάστου διαστύλου τῆς ὁποίας ἐνεργεῖ βάρος ἐξ ἴσου ἐπὶ παραδείγματι διανεμημένον. Αἱ ἀντιδράσεις τῶν ὑποστηρίγματων, αἵτινες

εἶνε ἄγνωστοι, εἰσὶ τὸν ἀριθμὸν $n+1$. Μοιράζομεν τὴν δοκὸν εἰς τόσα τεμάχια, ὅσα διαστύλα ὑπάρχουσιν, ἔχομεν δ' οὕτω δι' ἕκαστον τούτων διαφορικὴν ἐξίσωσιν ὁρίζουσαν τὸ σχῆμα τῆς οὐδετέρας ἰνὸς μετὰ τὸν μετασχηματισμὸν, ἢ δ' ὁλοκλήρωσις τῶν n τούτων διαφορικῶν ἐξισώσεων, αἵτινες εἶνε τῆς δευτέρας τάξεως, εἰσάγει $2n$ αὐθαίρετους σταθεράς, αἵτινες δεόν νὰ προσδιορισθῶσιν. Ὁ ὀλίκος ἀριθμὸς τῶν ἀγνώστων εἶνε ὅθεν:

$$\begin{array}{r} \text{Ἀντιδράσεις} \dots\dots\dots n+1 \\ \text{Αὐθαίρετοι σταθεραὶ} \dots\dots\dots 2n \\ \hline \text{Ἐν ὅλῳ} \dots\dots\dots 3n+1 \end{array}$$

Πρὸς εὔρεσιν τῶν τιμῶν τῶν $3n+1$ τούτων ἀγνώστων ἔχομεν $3n+1$ ἐξισώσεις.

Τῶ ὄντι, ἐν ἐκάστῳ διαστύλῳ ἡ οὐδετέρα ἰς ὀφείλει νὰ διέρχεται μετὰ τὸν σχηματισμὸν διὰ τῶν δύο ὑποστηρίγματων, ἅτινα περιορίζουσι τὸ διάστυλον. Ὁ διπλοῦς οὗτος ὅρος, ὃν ἕκαστον διάστυλον ὀφείλει νὰ πληροῖ, δίδει δύο ἐξισώσεις ἀνὰ διάστυλον, ἤτοι $2n$ ἐξισώσεις δι' ὅλην τὴν δοκὸν. Ἐπὶ πλέον δύο διαδοχικὰ διαστύλα ἔχουσι κοινὴν ἐφαπτομένην ἐπὶ τοῦ κοινοῦ αὐτῶν ὑποστηρίγματος, ὅρος ἐξ οὗ προκύπτουσιν ἕτεροι $n-1$ ἐξισώσεις. Ἐχομεν ἀκόμη τὰς δύο ἐξισώσεις, ἃς δίδει ἡ στατικὴ καὶ αἵτινες ἐκφράζουσιν ὅτι τὸ ἄθροισμα τῶν ἀντιδράσεων τῶν ὑποστηρίγματων ἰσοῦται τῶ ἄθροισματι τῶν ἐπὶ τῆς δοκοῦ βαρῶν καὶ ὅτι ὑπάρχει ἰσότης μετὰ τῶν ῥοπῶν τῶν δύο τούτων ομάδων δυνάμεων, Ἐχομεν οὕτω

$$\begin{array}{r} \text{Διὰ τὰ γνωστὰ σημεῖα τοῦ} \\ \text{οὐδετέρου ἄξονος} \dots\dots\dots 2n \quad \text{ἐξισώσεις} \\ \text{Διὰ τὴν συνεπαφὴν ἐπὶ τοῦ} \\ \text{ἐνδιαμέσου ὑποστηρίγματος} \dots\dots\dots n-1 \quad \text{»} \\ \text{Διὰ τὴν ἰσορροπία τῶν ἐξω-} \\ \text{τερικῶν δυνάμεων} \dots\dots\dots 2 \quad \text{»} \\ \hline \text{Ἐν ὅλῳ} \dots\dots\dots 3n+1 \quad \text{ἐξισώσεις} \end{array}$$

Τὸ πρόβλημα ὅθεν εἶνε ὠρισμένον. Ἄλλ' ἢ ἐκτεθεῖσα μέθοδος ἄγει εἰς ὑπολογισμοὺς ἐκτάκτως κοπιώδεις. Ἐπὶ παραδείγματι διὰ δοκὸν μετὰ 8 διαστύλων, ἀριθμὸν ὅστις οὐδὲν ἔχει τὸ ἐξαιρετικόν, πρέπει νὰ λύσῃ τις 25 ἐξισώσεις τοῦ πρώτου βαθμοῦ μετ' ἰσαριθμῶν ἀγνώστων.

Γινώσκομεν ὅμως πρὸς ἐπίλυσιν τῶν ζητημάτων τούτων, ἅτινα ἀπαντῶσι συχνότατα ἐν τῇ πράξει τῶν μεγάλων ἔργων, μέθοδον κατὰ πολὺ ταχύτεραν στηριζομένην ἐπὶ τοῦ θεωρήματος τῶν τριῶν ῥοπῶν, εὐρεθέντος κατὰ τὸ 1855 ὑπὸ τοῦ μηχανικοῦ Bertot, ἀναπτυχθεῖσαν δ' ὑπὸ τοῦ Clapeyron.